



تیووا



واحد آموزش سلامت

تداخل های دارویی

مصرف همزمان با سایر داروهای آنتی کولینروژنیک توصیه نمی شود.

نکته: برای جلوگیری از این تداخل، لیست تمام داروهایی که مصرف می کنید را در اختیار پزشکتان قرار دهید. مصرف در دوران بارداری: کی پی تیووا نباید در دوران بارداری مصرف گردد.

مصرف کپسول در دوران شیردهی: کی پی تیووا نباید در دوران شیردهی مصرف گردد.

مصرف در سالمندان: بیماران سالمند ممکن است نسبت به عوارض جانبی این دارو به خصوص یبوست، خشکی

دهان و دشواری ادرار حساس تر باشند

مصرف در کودکان: اطلاعاتی ثبت نشده است. وابسته ب نظر پزشک معالج میباشد.

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی رازی

تلفن 31626000(056)

<http://www.razi.bums.ac.ir>

عوارض جانبی

خشکی دهان

یبوست

سرگیجه

ادرار دردناک یا دشوار

ضربان قلب سریع

درد/لورم/قرمزی چشم

تغییر در دید(مانند دیدن رنگین کمان دور نورها در

شب، تاری دید)

جوش، خارش، ورم(به خصوص روی صورت، زبان و گلو)

گیجی شدید، تنگی نفس

نکته: در صورت مشاهده هر کدام از این علائم حتما به

پزشک خود اطلاع دهید.

عملکرد :

دارو سبب مهار رقابتی و برگشت پذیر رسپتورهای موسکارینی شده و در نتیجه باعث گشادی برونش می شود

رده دارویی:

گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم

نام تجاری : Spiriva

نام لاتین KP-Tiova

اشکال دارویی:

کپسول حاوی پودر خشک قابل استنشاق

موارد منع مصرف

بیماران با سابقه حساسیت به تیوترپیوم، آتروپین و مشتقات آن مانند ایپراتروپیوم، اکسی تروپیوم و یا هرگونه ترکیب مورد استفاده در این فرآورده (مانند لاکتوزمونو هیدرات) نباید مصرف گردد

موارد مصرف

مدیریت بیماری مزمن انسدادی ریه
مدیریت بیماری آسم
گشاد کردن مجاری تنفسی
آسان شدن تنفس

کپسول کی پی تیوا تنها باید توسط رولایزر مربوطه استنشاق گردد

در صورت داشتن هرگونه سؤال یا مشکل در مراقبت از خود، می توانید با شماره تلفن **056 31626300** در تمام ساعات روز تماس فرمایید و آموزشهای لازم را رایگان دریافت نمایید.