



پژوهشی و درمانی رازی  
مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی رازی

## زیپمت



واحد آموزشی سلامت

### نکات:

به منظور کاهش احتمال تحریکات معده، دارو را همراه با غذا میل نمایید.  
-قند خون خود را به صورت دوره‌ای کنترل نموده و به‌طور منظم به پزشک خود مراجعه کنید.  
- از مصرف دارو تحت شرایط زیر خودداری نموده، با پزشک خود تماس بگیرید:  
• دِهیدراسیون یا از دست‌دادن حجم زیادی از مایعات بدن  
• عکس‌برداری با اشعه ایکس با یا بدون مواد حاجب  
• در شرایط استرس مانند تب، ضربه، تصادف، عفونت و یا جراحی، مقدار مصرف دارو ممکن است تغییر یابد  
- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یادآوردن فوراً آن را میل کنید. ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرارسیده باشد، نوبت فراموش شده را مصرف نکرده و برنامه عادی خود را از سر بگیرید. از دوبرابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی رازی  
تلفن 31626000(056)  
<http://www.razi.bums.ac.ir>

### عوارض جانبی

مشکلات گوارشی مانند تهوع و استفراغ، اسهال، نفخ و ناراحتی معده از عوارض جانبی شایع زیپمت است که در صورت مصرف زیپمت همراه وعده غذایی میتوان به کاهش این علائم کمک کرد. کاهش قند خون و ضعف و بی حالی به ویژه زمانی که زیپمت را همراه دیگر داروهای کاهنده قند خون مانند انسولین یا سولفونیل اوره مصرف کنید مشاهده میشود.



CODE: 1306330

www.parsstock.ir

parstock

## دسته بندی:

هورمون ها و جایگزین های سنتزی < داروهای ضد دیابت

## مکانیسم اثر:

سیتاگلیپتین موجود در این دارو از طریق مهار آنزیم دی پپتیدیل پپتیداز 4 و متفورمین موجود در آن از طریق کاهش مقاومت به انسولین باعث کاهش قند خون می شوند. در ضمن هر دو ترکیب با کاهش تولید گلوکز در کبد به کنترل قند خون کمک می کنند.

## اشکال دارویی:

زیپمت ۵۰/۵۰۰: هر قرص حاوی ۵۰ میلی گرم سیتاگلیپتین (به فرم مونو فسفات) و ۵۰۰ میلی گرم متفورمین (به فرم هیدروکلراید) است.  
زیپمت ۵۰/۱۰۰۰: هر قرص حاوی ۵۰ میلی گرم سیتاگلیپتین (به فرم مونو فسفات) و ۱۰۰۰ میلی گرم متفورمین (به فرم هیدروکلراید) است.

## موارد مصرف:

دیابت ملیتوس نوع ۲

## دستور مصرف:

معمولاً زیپمت روزی دو بار تجویز میشود که به منظور کاهش احتمال ناراحتیهای معده بهتر است همراه با غذا میل شود. در طول مصرف دارو همواره باید قند خون خود را چک کرده و به پزشک اطلاع دهید تا در صورت نیاز دوز مصرفی شما تغییر یابد. از مصرف خودسرانه یا قطع خودسر دارو بپرهیزید



## منع مصرف:

سابقه واکنش حساسیتی شدید به زیپمت یا سیتاگلیپتین مانند آنافیلاکسی یا آنژیوادم سابقه واکنش حساسیتی به متفورمین هیدروکلراید دیابت نوع یک  
- اسیدوز متابولیک حاد یا مزمن شامل کتواسیدوز دیابتی همراه با و یا بدون اغماء و افزایش کتون ها در خون یا ادرار  
- بیماری شدید و یا اختلال عملکرد کلیه که ممکن است ناشی از شرایطی چون کولاپس قلبی عروقی (شوک)، انفارکتوس حاد میوکارد و یا سیتی سمی باشد  
- بیماری شدید، حاد یا مزمن کبد  
- در بیماران تحت بررسی های رادیولوژی با تزریق عضلانی مواد کنتراست ید دار  
- سوختگی های شدید  
- از دست دادن شدید آب بدن  
- عفونت شدید  
- جراحی بزرگ  
- ضربات شدید  
- در شرایطی که کاهش میزان اکسیژن خون وجود دارد  
- در بیماران با سن بالاتر از 80 سال