



پزشکدانشگاه بوعلی سینا رازی
مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی رازی

نیوبت / رپاگلینید



واحد آموزشی سلامت

تداخل های دارویی

این دارو با جم فیبروزیل، کلاریترومایسین، ایتراکونازول، فلوکونازول، فنی توئین، کاربامازپین، مهار کننده های گیرنده بتا، مهار کننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین، داروهای NSAID، کورتیکواستروئیدها و هورمون های تیروئیدی تداخل دارد

روش مصرف

داروی رپاگلینید را نیم ساعت قبل از غذا مصرف نمایید. و در صورتی که یک وعده غذایی را مصرف نکردید، آن دوز از دارو را نیز حذف کنید.

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی رازی

تلفن 31626000(056)

<http://www.razi.bums.ac.ir>

عوارض جانبی

- سر درد
- تاری دید
- افت قند خون
- ایسکمی
- درد قفسه سینه
- عفونت مجاری تنفسی فوقانی
- سینوزیت
- برونشیت
- واکنش ازدیاد حساسیت
- کمر درد
- درد مفاصل
- افزایش وزن
- درد شکم و معده
- تهوع
- استفراغ
- اسهال
- یبوست

طبقه بندی درمانی :

هورمون ها و جایگزین های سنتزی < داروهای ضد دیابت < مگلیتینیدها

نام تجاری : گلوکوموروم

اشکال دارویی

قرص خوراکی 0.5 میلی گرم
قرص خوراکی 1 میلی گرم
قرص خوراکی 2 میلی گرم

موارد مصرف

رپاگلینید یک داروی ضددیابت از دسته‌ی میگلپتینیدها می‌باشد که در کنترل قندخون در افراد با دیابت نوع دو که افزایش قند خون آنها با رژیم غذایی و ورزش به تنهایی کنترل نمی‌شود، قابل تجویز است



دستور مصرف دارو

طبق دستور پزشک مصرف شود و از قطع خودسرانه دارو پرهیز شود

موارد منع مصرف

سن زیر ۱۸ سال و یا بالای ۷۵ سال

حساسیت به این دارو یا دیگر داروها و موارد بارداری یا تصمیم به بارداری

شیردهی

بیماری کبدی

بیماری کلیوی

عفونت یا بیماری مزمن