

منع مصرف:

حساسیت به دارو و سایر اجزای فرمولاسیون
حساسیت به سایر سولفونیل اورهها و سایر سولفونامید
دیابت نوجوانان (Juvenile diabetes)

دیابت کتواسیدوزیس

دیابت پیش کما و کما

نارسایی شدید کلیوی و کبدی

شرایط استرس (عفونت جدی، تروما و جراحی)

مصرف همزمان با میکونازول

بارداری

شیردهی



موارد مصرف:

دیابت ملیتوس نوع ۲

دستور مصرف:

هیچ رژیمی با دوز ثابت برای مدیریت دیابت با گلیکلازید وجود ندارد و دوز بر اساس اندازه گیری های مکرر قند خون برای هر فرد جداگانه تعیین میشه. دارو با غذا میل بشه و قرصهای آهسته رهش با صبحانه داده بشن. قرص آهسته رهش 60 میلی گرمی ممکنه نصف بشن ولی قرص آهسته رهش 30 میلی گرمی باید با طور کامل بلعیده بشه.

همراه با وعده های غذایی مصرف بشه و فرم های آهسته رهش با اولین وعده غذایی مصرف بشه.

دیابت ملیتوس نوع 2: فرم معمولی 80 میلی گرم دو بار در روز افزایش دوز با توجه به سطح گلوکز خون مشخص میشه دوز معمول 80 تا 320 میلی گرم در روزه و در دوز های بالای 160 میلی گرم باید به صورت مساوی در دو نوبت در روز مصرف بشه.

دیابت ملیتوس نوع 2: فرم آهسته رهش؛ 30 ملی گرم در روز همراه صبحانه افزایش دوز با توجه به سطح گلوکز خون به صورت 30 میلی گرم هر 2 هفته انجام میشه تا ماکسیمم 120 میلی گرم در روز.

دسته بندی:

هورمون وغدد>ضد دیابت>سولفونیل اوره

مکانیسم اثر:

افزایش ترشح انسولین از سلولهای بتا پانکراس

افزایش حساسیت محیطی نسبت به انسولین

کاهش جذب انسولین و میزان تولید گلوکز توسط کبد

اسامی تجاری:

کلازکس - (Clazex) قرص 80 میلی گرم

دیابزید - (Diabezid) قرص آهسته رهش) 30 و 60 میلی گرم - قرص 80 میلی گرم

دیامیکرون - (Diamicron) قرص آهسته رهش 30 میلی گرم

گلیزیتکس - (Glizitex) قرص 80 میلی گرم زیدامود - (Zidamod) قرص آهسته رهش) 30 میلی گرم

اشکال دارویی:

قرص خوراکی 80 میلی گرم

قرص خوراکی TE (آهسته رهش) 30 میلی گرم

قرص خوراکی TE (آهسته رهش) 60 میلی گرم



دارو های ضد دیابت

گلیکلازید (دیابزید)



با رویکرد مراقبت از خود و آموزش به مددجو

واحد آموزش سلامت

مسمومیت ها:

320 میلی گرم در روز به فرم معمولی

120 میلی گرم در روز به فرم آهسته رهش

نکات:

در نقصها خفیف تا متوسط کبدی و کلیوی نیاز به تنظیم دوز نداره اما ممکنه کاهش دوز نیاز باشه.

در نقص های شدید کبدی و کلیوی منع مصرف داره.

بیماران NPO و کسانی که نیاز به کاهش دریافت کالری دارن برای جلوگیری از هایپوگلیسمی به دوزهایی نیاز دارن.

بیماران NPO و کسانی که نیاز به کاهش دریافت کالری دارن برای جلوگیری از هایپوگلیسمی به دوزهایی نیاز دارن.

قرص های آهسته رهش نباید خرد یا جویده بشن.

یک قرص آهسته رهش ۳۰ میلی گرمی ، معادل یک

قرص معمولی ۸۰ میلی گرمی هست.

در بیماران مبتلا به PD6G باید با احتیاط مصرف بشه.

مصرف همزمان با اتانول میتونه باعث واکنش های شبه

دیسولفیرام بشه.

عوارض جانبی:

افت قند خون

افزایش فشار خون

سردرد

اسهال

عفونت مجاری ادراری

عفونت ویروسی درد کمر درد مفصل

ضعف

التهاب برونشها

آبریزش بینی

التهاب گلو

عفونت فوقانی مجاری تنفسی

