



استحکام پر کن و خذات بیدستی باش پژوه

مرکز آموزشی، پژوهشی و دانلی رازی

داروهای قلبی عروقی


آسپرین یا آ.اس.آ (ضد انعقاد خوراکی)



با رویکرد مراقبت از خود و آموزش به مددجو
واحد آموزش سلامت

علائم خطر جهت مراجعه به پزشک چیست؟

- خون ریزی (ادرار، مدفوع قیری یا سیاه رنگ، استفراغ یا سرفه خونی، خونریزی از بینی و...)
- از دست دادن دید.
- اختلال در تکلم (به سختی صحبت کردن)
- ضعف یا بی حسی در یک طرف بدن
- گیجی
- تنگی نفس و درد قفسه سینه



در صورت داشتن هرگونه سوال یا مشکل در مراقبت
از خود، می توانید با شماره تلفن -**31626164**
31626156 در تمام ساعات روز تماس فرمایید و
آموزشای لازم را رایگان دریافت نمایید.

آیا مصرف آسپرین خطری دارد؟

صرف روزانه آسپرین خطر ابتلا به عوارض جانبی زیر را افزایش می دهد:

۱. خون ریزی: مشکلات خونریزی می توانند جزئی یا جدی باشد. یک نمونه از یک مشکل جزئی جراحت زخم است که خونریزی اش متوقف نمی شود. یک نمونه از یک مشکل جدی، خونریزی معده یا خونریزی مغزی است.

۲. درد و ناراحتی شکم

۳. حساسیت: اگر پولیپ بینی دارید، احتمال حساسیت به آسپرین در شما زیاد است.

۴. ممکن است دچار تهوع، سرگیجه و تاری دید شوید.



آسپرین با کدام داروها تداخل دارد؟

۱- مصرف همزمان با کاپتوپریل و داروهای ادرار آوری مثل اسپرینولاکتون ممنوع است. زیرا باعث مشکلات کلیوی می گردد.

۲- مصرف همزمان با کورتون ها مثل هیدرو کور تیزون باعث افزایش احتمال خونریزی می گردد.




مددجوی گرامی، سلام

این برگه شامل نکاتی در مورد آشنایی با داروی آسپرین یا آ.اس.آ می باشد. لطفاً این مطالب را با دقت مطالعه بفرمایید. امیدواریم با رعایت این نکات، سلامتی خود را بازیابید.

آسپرین (آ.اس.آ) چه تأثیری بر قلب شما دارد؟

آسپرین یک دارو است که بر لخته شدن خون (انعقاد خون) تأثیر می گذارد. آسپرین می تواند برای کمک به کاهش خطر لخته شدن خون، حملات قلبی و سایر مشکلات مرتبط با قلب استفاده شود.



صرف آسپرین از تشکیل لخته خون و بروز عوارض ناشی از آن مثل سکته قلبی و مغزی جلوگیری می کند

آیا شما باید آسپرین مصرف کنید؟

پژوهش شما تعیین می کند که آیا مصرف آسپرین روزانه برای شما مفید و مطمئن است یا نه. در موارد زیر ممکن است مصرف آسپرین روزانه مفید باشد:

- اگر حمله قلبی یا درد قفسه سینه شده اید..
- اگر عمل جراحی قلب باز داشته اید.
- اگر دچار تنگی یا انسداد رگ های قلب بوده اید و بالون زده اید یا استنت (فرن) گذاشته اید.
- اگر سکته مغزی را تجربه کرده اید.
- اگر بیماری عروقی (مثل تشکیل لخته در پاهای در اثر بی حرکتی) داشته اید.
- اگر ضریان قلب نامنظمی دارید.



بیمار عزیز، از مصرف داروها بدون نسخه پژوهش به خصوص داروهای سرماخوردگی که ضربان قلب را افزایش می دهند، خودداری نمایید.



آسپرین دارای پوشش روده ای

