

زالربان



نکاتی که باید قبل از مصرف این دارو بدانید

در صورتی که به زالربان حساسیت دارید یا آنکه دچار خونریزی فعال یا کنترل نشده هستید باید از مصرف این دارو خودداری نمایید. این نوع لخته خون می‌تواند باعث فلج شدن دائمی شود. ریسک بروز این مشکلات در صورت ابتلا به موارد زیر افزایش می‌یابد:

در صورتی که دچار نقیص مادرزادی نخاع باشید.

در صورتی که دارای کتف نخاعی هستید.

در صورتی که سابقه انجام جراحی نخاع یا موارد مشابه را دارید.

در صورتی که از داروهای غیر استروئیدی ضد التهاب استفاده می‌کنید.

در صورتی که از داروهای دیگری برای درمان یا پیشگیری از لخته شدن خون استفاده می‌کنید.

زالربان می‌تواند به راحتی باعث خونریزی شود که ریسک خونریزی در موارد زیر افزایش خواهد یافت:

ابتلا به اختلالات خونریزی دهنده ارثی یا اختلالی که به علت بیماری به وجود آمده باشد.

سکته مغزی هموراژیک

فشار خون کنترل نشده

زخم شدگی یا خونریزی از معده یا روده

مصرف برخی داروها از قبیل آسپرین، هپارین و وارفارین، کلیدینوگرل یا برخی داروهای ضد اسردگی خاص

در صورت ابتلا به مشکلات زیر باید به پزشک خود اطلاع دهید:

داشتن تریچه مصنوعی قلب

ابتلا به بیماری‌های کبدی یا کلیوی

در دوران بارداری

در دوران شیردهی



چگونه باید زالربان را مصرف کرد؟

۱. طبق دستور پزشک
 ۲. طریقه مصرف در برخی از بیماری‌ها باید این دارو به همراه غذا مصرف گردد. مصرف زالربان به همراه غذا یا بدون غذا به دوز دارو بستگی دارد (طبق دستور پزشک)
 ۳. در صورتی که برای قورت دادن زالربان مشکل دارید باید به پزشک خود اطلاع دهید.
 ۴. در صورتی که به علت یک مشکل دیگر به پزشک مراجعه می‌کنید باید به او اطلاع بدهید که از زالربان استفاده می‌کنید.
 ۵. بدون مشورت با پزشک از قطع مصرف دارو یا تغییر دوز آن خودداری کنید زیرا قطع ناگهانی و خودسرانه زالربان می‌تواند ریسک لخته شدن خون و سکته مغزی را افزایش دهد.
 ۶. این دارو را در نمای اتلق و به دور از رطوبت و گرما نگهداری کنید.
 ۷. به هیچ عنوان بدون مشورت با پزشک داروی تجویز شده خود را قطع نکنید.
- در صورت مصرف بیش از حد دارو چه باید کرد؟
- در صورت بروز چنین مشکلی باید فوراً به پزشک مراجعه کنید زیرا مصرف بیش از حد زالربان می‌تواند باعث خونریزی شدید شود.

چگونه باید زالربان را مصرف کرد؟

۱. طبق دستور پزشک
۲. طریقه مصرف در برخی از بیماری‌ها باید این دارو به همراه غذا مصرف گردد. مصرف زالربان به همراه غذا یا بدون غذا به نوز دارو بستگی دارد (طبق دستور پزشک)

۳. در صورتی که برای قورت دادن زالربان مشکل دارید باید به پزشک خود اطلاع دهید.

۴. در صورتی که به علت یک مشکل دیگر به پزشک مراجعه می‌کنید باید به او اطلاع دهید که از زالربان استفاده می‌کنید.

۵. بدون مشورت با پزشک از قطع مصرف دارو یا تغییر دوز آن خودداری کنید زیرا قطع ناگهانی و خودسرانه زالربان می‌تواند ریسک لخته شدن خون و سگته مغزی را افزایش دهد.

۶. این دارو را در دمای اتاق و به دور از رطوبت و گرما نگهداری کنید.

۷. به هیچ عنوان بدون مشورت با پزشک داروی تجویز شده خود را قطع نکنید.

در صورت مصرف بیش از حد دارو چه باید کرد؟

در صورت بروز چنین مشکلی باید فوراً به پزشک مراجعه کنید زیرا مصرف بیش از حد زالربان می‌تواند باعث خونریزی شدید شود.

در هنگام مصرف زالربان باید از چه اقداماتی خودداری کرد؟

باید از انجام دادن هر گونه فعالیتی که ریسک خونریزی و آسیب دندگی را افزایش می‌دهد خودداری کنید و در هنگام انجام دادن برخی اقداماتی از قبیل مسواک زدن دندان یا شیو کردن دقت داشته باشید تا دچار بریدگی و خونریزی نشوید.



عوارض جانبی زالربان چیست؟

در صورتی که دچار علائم و نشانه‌های آلرژی از قبیل کهیر، اختلال در تنفس، تورم صورت، زبان، لب یا گلو شده اید فوراً به پزشک مراجعه کنید. در صورتی که دچار علائم و نشانه‌های حاصل از لخته خون در ستون فقرات شده اید مانند درد کمر و بی‌حسی یا ضعف عضلات پایین تنه یا اختلال در عملکرد مثانه یا روده باید فوراً به پزشک مراجعه کنید.

در صورتی که دچار علائم و نشانه‌های خونریزی که به شرح زیر می‌باشند شده اید باید فوراً به پزشک مراجعه نمایید:

- خونریزی یا کبودی به ویژه خونریزی از لثه و بینی یا چرخه‌های سنگین پریدود
- درد، تورم، ترشحات جنید یا خونریزی بیش از حد از زخم یا محلی که دارو تزریق شده است.
- قطع نشدن خونریزی از یک قسمت از بدن
- سردرد، سرگیجه، ضعف و برخی احساسات دیگر که باعث می‌شود تصور کنید دچار بیهوشی خواهید شد.
- قرمز، صورتی یا قهوه ای شدن رنگ اندام
- قهوه ای شدن رنگ مدفوع یا خون مشاهده خون در آن یا وجود خون در استقراغ که شبیه دانه‌های قهوه به نظر می‌رسد.



منبع: داروهای ژنریک