



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رازی
مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی رازی

داروهای قلبی عروقی

بتابلوگرها (متورال، ایندرال و...)

متورال ۵۰
متوپرولول
۳۰ عدد قرص
هر قرص محتوی:
متوپرولول بتالات ۵۰ میلی‌گرم
هشدار: بدون دستور پزشک مصرف دارو را قطع نکنید.
بدون دستور پزشک دوز دیگری را همراه دارو مصرف نکنید.
دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

البرز دارو



با رویکرد مراقبت از خود و آموزش به مددجو

واحد آموزش سلامت

علائم خطر جهت مراجعه به پزشک چیست؟

- کاهش شدید فشارخون
- اشکال در تنفس
- تورم دست و پاها
- سردی دست و پاها
- سرگیجه
- افسردگی
- کاهش شدید نبض (تعداد ضربان قلب)



بیرجند خیابان غفاری

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی رازی

تلفن ۰۵۶)۳۱۶۲۶۰۰۰

<http://www.razi.bums.ac.ir>

در مصرف متورال چه نکاتی را باید رعایت کنید؟

دارو را همراه غذا مصرف کنید (به دلیل جذب بهتر دارو).

از قطع ناگهانی مصرف دارو اجتناب کنید.

قبل از مصرف دارو حتماً به روشی که به شما آموزش داده شده است، تعداد ضربان قلب خود را در یک دقیقه شمارش کنید. در صورتی که تعداد ضربان قلب (نبض) شما کمتر از ۶۰ بار در دقیقه بود، قبل از مصرف دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

قبل از مصرف دارو حتماً به روشی که به شما آموزش داده شده است، فشارخون خود را کنترل نمایید. در صورتی که فشار خون شما کمتر از ۱۰۰ میلی متر جیوه بود، قبل از مصرف دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

این دارو نیز همانند ایندرال ممکن است علائم کاهش قند خون را پنهان کند.. لذا در صورتی که دیابت (قندخون بالا) دارید، حتماً هنگام مصرف این دارو نکاتی را که پزشک تذکر داده است، رعایت نمایید.



فشارسنج دستی



فشارسنج دیجیتال

مددجوی گرامی؛ سلام

این برگه شامل نکاتی در مورد آشنایی با داروهای شما می باشد. لطفاً این مطالب را با دقت مطالعه بفرمایید. امیدواریم با رعایت این نکات سلامتی خود را بازیابید.



داروهای این دسته کدامند؟

- ایندرال (پروپرانولول)
- متورال (متوپرولول)
- آتنولول
- کارودیلول



کاربرد این داروها چیست؟

- ◇ کاهش فشار خون
- ◇ کاهش کار قلب
- ◇ جلوگیری از ایجاد اختلال در ضربان قلب
- ◇ کاهش تعداد ضربان قلب



در مصرف ایندرال چه نکاتی را باید رعایت کنید؟

- از قطع خودسرانه ی دارو حتی در صورتی که احساس بهبودی می کنید خودداری نمایید.
- دارو باید طبق تجویز پزشک طی چند هفته به تدریج کم و سپس قطع شود.
- شکل خوراکی دارو را هنگام غذا مصرف کنید.
- در صورتی که بیماری کلیوی یا دیابت (قندخون بالا) دارید، حتماً با پزشک خود درباره نحوه مصرف داروها مشورت نمایید.
- به علت امکان بروز سرگیجه یا تاری دید، هنگام انجام فعالیت ها و بلند شدن از رختخواب احتیاط کنید.



بیمار عزیز، از مصرف داروها بدون نسخه پزشک به خصوص داروهای سرماخوردگی که ضربان قلب را افزایش می دهند، خودداری نمایید.



آیا مصرف ایندرال خطری دارد؟

این دارو ممکن است علائم کاهش قندخون را مخفی نماید. لذا در صورتی که دیابت (قندخون بالا) دارید، حتماً هنگام مصرف این دارو نکاتی را که پزشک تذکر داده است، رعایت نمایید.

ازجمله عوارض جانبی این داروها می توان به موارد زیر اشاره کرد:



- ◇ کاهش فشارخون
- ◇ خستگی
- ◇ بی حالی
- ◇ کاهش ضربان قلب

بنابراین ضروری است این داروها را درست مطابق دستور پزشک مصرف کنید.

در صورت بروز علائم زیر به پزشک مراجعه کنید:

- تنفس سخت به ویژه در هنگام دراز کشیدن
- سرفه به خصوص در شب ها
- تورم دست و پاها
- لکه های پوستی
- سرگیجه
- تب و گلودرد
- خون ریزی غیرطبیعی یا کبودی

