



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی رازی

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی رازی

داروهای قلبی عروقی

داروهای مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین



با رویکرد مراقبت از خود و آموزش به مددجو

واحد آموزش سلامت

علائم خطر جهت مراجعه به پزشک چیست؟

در صورتی که زبان و لب های شما متورم شد، سریعاً به مراکز اورژانس مراجعه کنید، زیرا شما دچار واکنش های حساسیتی جدی این داروها شده اید، که بسیار نادر است.



بیرجند خیابان غفاری

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی رازی

تلفن (۰۵۶)۳۱۶۲۶۰۰۰

<http://www.razi.bums.ac.ir>

آیا این مصرف داروها خطری دارد؟

- عوارض جانبی این داروها نادر است.
- سرفه های خشک در ابتدای مصرف این دارو ممکن است ایجاد شود که پس از مدتی از بین می رود، در صورتی که برطرف نشد، با پزشک برای تغییر میزان یا نوع دارو مشورت کنید.
- احساس سرگیجه نیز در ابتدای مصرف دارو کاملاً طبیعی است و تنها نکته ای که باید در نظر گرفته شود، توجه در هنگام بلند شدن از تخت خواب است که باعث افتادن و صدمه نشود.



سایر عوارض جانبی:



- ◇ سردرد
- ◇ احساس خستگی
- ◇ از دست دادن اشتها
- ◇ ناراحتی معده
- ◇ اسهال
- ◇ خارش پوست یا تاویل
- ◇ تب

مددجوی گرامی؛ سلام

این برگه شامل نکاتی در مورد آشنایی با داروهای شما می باشد. لطفاً این مطالب را با دقت مطالعه بفرمایید. امیدواریم با رعایت این نکات سلامتی خود را بازیابید.



داروهای این دسته کدامند؟

- کاپتوپریل
- فوزینوپریل
- لیزینوپریل
- پریندوپریل
- تراندولاپریل
- انالاپریل




عملکرد این داروها چیست؟

مهار کننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین به شل شدن و انبساط رگ های خونی کمک می کنند، در نتیجه مانع از افزایش فشار خون و کار قلب می شوند.



این داروها چه زمانی تجویز می شوند؟

- درمان فشار خون بالا
- سکته مغزی
- حملات قلبی
- کاهش خطر سکته مغزی یا حمله قلبی
- درمان مشکلات کلیوی
- درمان دیابت



این داروها با نام ها و مارک های مختلف در بازار موجود است و از نظر کارآیی تفاوتی باهم ندارند و تنها تفاوت در عوارض جانبی آنها می باشد.



نکات مهم در مصرف این داروها چیست؟

- از مصرف همزمان این داروها با ایبوپروفن ، آسپرین و ناپروکسن خودداری کنید و قبل از آن با پزشک مشورت کنید.
- در صورتی که از داروهای دیگر مانند داروهای بدون نسخه پزشک، ادرارآورها، قرص های پتاسیم و یا مکمل های گیاهی و غذایی، استفاده می کنید، پزشک را در جریان قرار دهید.
- این داروها در زمان حاملگی و شیردهی منع مصرف دارد.

