

چند نکته برای مراقبت از کاتتر شالدون:

▪ کاتتر خود را همیشه تمیز و خشک نگه دارید. این به معنی آن است که نمی توانید شنا کنید یا حمام بروید.

▪ مراقب باشید کاتترتان مخصوصاً "موقع تعویض لباس کشیده نشود، تیم دیالیز به شما آموزش می دهد که چگونه روی کاتتر را بپوشانید و از آن مراقبت کنید.

▪ به سمتی که کاتتر شالدون دارید، نخوابید. روزانه پانسمان کاتتر شالدون را با مراجعه به درمانگاه تعویض کنید، یا با آموزش توسط خودتان (یا همراه بیمار) تعویض گردد .

▪ دوش گرفتن دستی بطوریکه ناحیه کاتتر شالدون در آب غوطه ور نشود بهترین روش است. اگر دوش گرفتن قبل از آمدن به دیالیز باشد بهتر است. پانسمان



چطور باید از کاتتر شالدون مراقبت کنیم ؟

کاتترهای موقت با بخیه سر جای خود محکم می شوند.

کاتترهای دائم را با یک روکش خاص و چند بخیه در زیر پوست محکم کار می گذارند .

از آنجا که قسمتی از کاتتر داخل بدن و قسمت دیگری از آن خارج از بدن است احتمال آلوده شدن و عفونت در آن زیاد است .

کاتتر وریدی مرکزی (شالدون) چیست ؟

کاتتر وریدی مرکزی نوعی کاتتر موقت است. زمانیکه بطور اورژانس نیاز به دیالیز داشته باشید و از قبل برایتان فیستول مناسب آماده نباشد، با روش جراحی در سیاهرگ مرکزی گردن و یا سینه و یا سیاهرگ رانی شما یک لوله پلاستیکی کار می گذارند تا از طریق آن بتوانید دیالیز شوید. برخلاف فیستول، کاتتر بلافاصله قابل استفاده است.


کاتترهای دائمی، کاتترهایی هستند که مدت طولانی تری مورد استفاده قرار می گیرند .

این روش در بیمارانی استفاده می شود که عروق محیطی خوبی ندارند یا امکان انجام گرافت وجود ندارد مثل کودکان، افراد دیابتی و افراد خیلی چاق.



پزشکانه آموزش و سلامت بهداشتی رازی
مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی رازی

شالدون چیست؟



واحد آموزش سلامت

منابع: کتاب برونر سودارث (بخش دیالیز)

" قفل موفقیت را با کلید آموزش باز کنیم. "

با آرزوی بهبودی و سلامتی روزافزون

در صورت داشتن هرگونه سؤال یا مشکل در مراقبت از خود، می توانید با شماره تلفن 31626166-31626156 در تمام ساعات روز تماس فرمایید و آموزشهای لازم را رایگان دریافت نمایید.

جدید به همراه پماد آنتی بیوتیک بر روی محل خارجی گذارده شود .

- در صورت نشت خون از محل ورود کاتتر به داخل بدن، به پرسنل بخش دیالیز اطلاع دهید.
- در صورت باز شدن بخیه‌های متصل کننده کاتتر به پوست و بیرون آمدن آن هرگز کاتتر به داخل برگردانده نشود. کاتتر را ثابت کرده و به پرسنل بخش دیالیز اطلاع دهید.

- از هرگونه تزریقات داخل کاتتر خودداری کنید.
- به نشانه های عفونت مانند قرمزی ورم، درد، چرک، تب توجه داشته باشید و با مشاهده هر یک از این علائم با پزشک خود تماس بگیرید.