

آموزش به بیمار قبل از آنژیوگرافی

- ۵- محل ورود کاتتر پانسمان شده و کیسه شن روی آن قرار می گیرد. برای جلوگیری از خونریزی از حرکت دادن پا خودداری کنید زیرا تحریک شدید باعث خونریزی از رگ می گردد.
- ۶- بیمار توسط پرستار بخش تحويل گرفته شده و به بخش باز می گردد.

آموزش به بیمار بعد از آنژیوگرافی

- ۱- در هنگام انتقال از تخت آنژیوگرافی به برانکارد و انتقال از برانکارد به تخت بخش همکاری شما لازم است چرا که تحرک زیاد احتمال خونریزی از موضع عمل را بیشتر می کند.
- ۲- محل عمل با کیسه های کوچک شن بیحرکت نگه داشته می شود. در ثابت نگه داشتن کیسه های شن همکاری کنید.
- ۳- ممکن است بعد از آنژیو گرافی چهار احساس زیاد یا کم شدن ضربان قلب، گرگرفتگی، گرمی و قرمزی، تهوع و استفراغ، خواب آلودگی و بیحالی شوید. این علائم را به پرستار اطلاع دهید و نگران نباشید چون این عوارض می تواند ناشی از تزریق دارو باشد.
- ۴- در صورت احساس گرمی و داغی و حرکت مایع در محل عمل ، سریعاً پرستار را خبر کنید چون ممکن است محل آنژیوگرافی خونریزی کرده باشد.
- ۵- هرگونه احساس کرختی، گزگز ، خواب رفتگی و بیحسی پاهای را اطلاع دهید.

۱۰- به دستور پزشک برای شما داروی آرامبخش بصورت خوراکی یا تزریقی تجویز می شود.

۱۱- موقع ورود شما به بخش فشارخون، نیض، درجه حرارت شما کنترل و نوار قلب شما گرفته می شود.

۱۲- قبل از رفتن به اتفاق عمل از خالی بودن مثانه خود اطمینان حاصل کنید و حتماً به دستشویی بروید.

آموزش به بیمار حین انجام آنژیوگرافی :

۱- محل ورود کاتتر (سوزن مخصوص آنژیوگرافی) که در اکثر قریب به اتفاق موارد در کشاله ران است توسط محلول ضد عفونی شستشو داده شده و سپس روی بدن شما پوشیده می گردد.

۲- پزشک محل آنژیوگرافی را با داروی بی حسی بطور موضعی بی حس می نماید و کاتتر مربوطه را وارد رگ می کند.

۳- در حین آنژیوگرافی هنگام درخواست پرستار یا پزشک برای نفس کشیدن نفس عمیق بکشید (مانند بو کردن گل) و سپس نفس خود را حبس کنید در ادامه از شما خواسته می شود سه سرفه متوالی بصورت تک تک و محکم انجام دهید این کار باعث می شود که کیفیت فیلم آنژیوگرافی شما مطلوبتر شود و مکث و کندی ضربان قلب که بعد از تزریق داخل کرونر ایجاد می شود بحال طبیعی باز گردد..

۴- بعد از انجام آنژیوگرافی حدود ۱۵-۲۰ دقیقه در اتفاق بعده می مانید تا خونریزی کنترل گردد.

۱- آنژیوگرافی روش کم خطری است که اطلاعات کاملی در مورد قلب شما ارائه می دهد.

۲- قبل از پذیرش در بیمارستان موهای زاید بدن را از ناحیه ناف تا زانو در هر دو پا شیو (تراشیده) کنید.

۳- از ۸ ساعت قبل، غذای جامد و از ۳ ساعت قبل مایعات میل نکنید.

۴- در هنگام مراجعه کلیه مدارک پزشکی از قبیل نوار قلب، عکس قفسه سینه، اکو، تست ورزش، آزمایشات و ... را بهمراه داشته باشید.

۵- داروهایی را که در منزل استفاده می نمایید مانند آسپرین و وارفارین را بهمراه داشته باشید.

۶- توجه کنید اضطراب و ترس کمکی به شما نخواهد کرد چراکه آنژیوگرافی روش بی دردی است که با بی حسی موضعی انجام می شود.

۷- در تمام مدتی که از قلب شما فیلم تهیه می شود پزشک کوچکترین تغییرات قلبی شما را با دستگاه مانیتورینگ کنترل می کند.

۸- برای اتصال سرم و تزریق دارو معمولاً یک رگ از شما گرفته می شود.


۹- نیض روی پا، روی قوزک پا، نیض پشت زانو کنترل و علامت زده می شود.



اداره کلیه خدمات بهداشتی و درمانی

مرکز آموزشی، پژوهشی و دانشگاهی رازی

مراقبتهای مربوط به آنژیوگرافی



در صورت داشتن هرگونه سؤال یا مشکل در مراقبت از خود، می توانید با شماره تلفن **31626166**-**31626156**-**31626164** در تمام ساعت روز تماس فرمایید و آموزشهای لازم را رایگان دریافت نمایید.

واحد آموزش سلامت

۱- اکثر بیماران صبح روز پس از آنژیوگرافی مرخص هستند و فقط بیمارانی که بایستی جهت ادامه درمان آنها اقدام شود باید همچنان بستری بمانند تا پزشک در مورد وضعیت آنها اقدام کند.

۲- فردای ترخیص در منزل پانسمان محل عمل را برداشته و دوش بگیرید و از لحاظ خونردمگی محل را بررسی کنید و تا یک هفته حمام در وان نداشته باشید.

۳- از لحاظ فعالیت در یکی دو هفته اول با احتیاط عمل نمائید و از اعمال فشار و کار سنگین اجتناب کنید و تا سه روز از رانندگی بپرهیزید.

۴- جواب آنژیوگرافی معمولاً همان روز آماده است با این وجود با هماهنگی با مرکز درمانی دریافت جواب را پیگیری نمائید و جهت ویزیت و تنظیم داروها به پزشک معالج مراجعه فرمائید.

۵- داروهای قبلی خود را طبق روال سابق ادامه دهید و در صورت تغییر در وضعیت قلب خود به پزشکتان مراجعه نمائید.

۶- قرص متفورمین را تا ۲ روز پس از آنژیوگرافی مصرف نکنید.

۷- کبودگی کشاله ران طبیعی است و ظرف ۲ هفته خودبخود برطرف می شود.

۸- در صورت وجود مشکلاتی نظیر اختلال حرکتی در انگشتان پا، خونریزی، تورم زیاد یا سردی پا به نزدیکترین محل درمانی مراجعه فرمائید.

۶- از خوردن غذا ۲-۳ ساعت بعد از آنژیوگرافی بپرهیزید. سپس با نظارت پرستار مصرف مایعات با مقدار کم را شروع کرده و سپس در صورت تحمل خوردن مواد جامد را شروع کنید.

✓ پرستار فشار خون، نبض و تنفس شما را ابتدا هر ۱۵ دقیقه و سپس هر نیم ساعت کنترل می کند.

✓ نیض پا و عدم خونریزی از محل عمل مرتب کنترل می شود.

✓ هرگونه تغییرات نبض، بی حالی، ضعف ناگهانی، تهوع و استفراغ سریعاً توسط پرستار به پزشک اطلاع داده می شود.

۸- حدود ۸ تا ۱۰ ساعت بعد از عمل شما می توانید به آرامی و با نظارت پرستار از تخت پائین بیایید. برای این منظور ایندا روی تخت بنشینید و سپس با آرامی پای خود را از لبه تخت آویزان کنید و در حالت نشسته پاها را روی زمین قرار دهید. اگر ضعف و سرگیجه ندارید با احتیاط و آرامی با کمک همراهتان راه بروید.