

سرگیجه:

سرگیجه یکی از شایع ترین علل مراجعه افراد بزرگسال به پزشک است و به ندرت نشان دهنده یک بیماری جدی و تهدید کننده حیات است.

شامل مجموعه وضعیتها مانند: سیاهی رفتن چشم، سرخوردن و خالی یا گود شدن زیر پا می شود اما سرگیجه حقیقی یا دورانی فقط شامل احساس چرخیدن خود فرد یا چرخش محیط اطراف می باشد که ناشی از بروز نوعی اختلال در سیستم عصبی یا گوارشی داخلی است.

أنواع سرگیجه بر اساس علت ایجاد کننده:

1. سرگیجه وضعیتی خوش خیم حمله ای :

(BPPV) معمولاً نتیجه یک تغییر ناگهانی یا موقتی در گوش داخلی یا در مغز می باشد بلافاصله به دنبال تغییر وضعیت سر ایجاد شده و

4. ناشی از یک تومور خوش خیم عصب شناوی

باشد علائم معمولاً شامل از بین رفتن تدریجی شناوی و وزوز گوش در یک طرف است که با سرگیجه و عدم تعادل همراه می باشد .

5. میگرون وستیولار که بیشتر از یک بیماری

سردرد است. ممکن است فرد دچار اختلالات بینایی، تاری دید شود و همچنین حساسیت به نور و صدا وجود داشته باشد.

ساير علل سرگیجه:

- کم آبی بدن بدلیل اسهال یا استفراغ
- استرس، اضطراب و فشارهای روانی
- حساسیت
- بی نظمی ضربان قلب
- بارداری
- خونریزی

علائم:

سرگیجه اغلب به شکل ناگهانی رخ می دهد. از

اغلب زمانی روی می دهد که فرد در بستر

می چرخد یا صبح از خواب بلند می شود بروز می کند شایع ترین علت سرگیجه دورانی می باشد

2. التهاب گوش داخلی. علائم شامل : شروع

ناگهانی سرگیجه به صورت مداوم و شدید که ممکن است چند روز طول کشیده و همراه تهوع، استفراغ و عدم تعادل باشد. این علائم ممکن است شدید باشد

3. بیماری منیر: در این بیماری مایع بسیار

زیادی در گوش داخلی جمع می شود. این بیماری با حمله های ناگهانی سرگیجه دورانی مشخص می شود که تا چند ساعت طول کشیده و با کاهش شناوی، صدای زنگ در گوش و احساس پری در گوش مبتلا همراه است .



ادشکا پرورشی، نهادهای آموزشی
و اسناد علمی

مرکز آموزشی، پژوهشی و دانلی رازی

سرگیجه



در صورت داشتن هرگونه سؤال یا مشکل در مراقبت از خود، می توانید با شماره تلفن 056 31626365 در تمام ساعات روز تماس فرمایید و آموزش‌های لازم را رایگان دریافت نمایید.

واحد آموزش سلامت

- از خم کردن و پایین نگه داشتن طولانی و

- ناگهانی سر اجتناب شود

- از حمامهای طولانی با آب گرم بوبیزه هنگام تنها

- بودن در منزل پرهیز شود

- هنگام تنها در منزل تلفن در دسترس قرار

- داده شود

- از مطالعه در اتومبیل اجتناب شود

- از حضور طولانی مدت در اتومبیل خودداری شود

- یکسری علائم اگر بروز کنند سریعاً باید به پزشک

- مراجعةه کرد از جمله:

- سردرد شدید، تاری دید یا دو بینی

- اختلال تکلم

- گیجی و کاهش هوشیاری

- بروز تشنج و سابقه سکته مغزی

- رنگ پریدگی، استفراغ شدید و عرق سرد

- سابقه دیابت و فشارخون

- درد شدید گوش یا خروج ترشحات چرکی از

- گوش

چند ثانیه تا چند روز ممکن است طول بکشد از علائم:

- تهوع و استفراغ

- سردرد خفیف

- تاری دید

- تعریق

- تپش قلب

- حساسیت به نور یا صدا

- صدای سوت یا زنگ در گوش

نکات آموزشی:

- از مصرف خودسرانه دارو اجتناب شود

- استراحت و خواب کافی داشته باشید

- مایعات کافی مصرف شود

- از مصرف غذایی شور پرهیز شود

- از هر گونه تغییر حالت ناگهانی (مثل از حالت

- نشسته به ایستاده) خودداری شود

- هنگام خواب زیر سر بالا نگه داشته شود

- هنگام برخاستن از رختخواب ابتدا برای چند در

- حال نشسته باشید