

برخی از نشانه‌های ضربه مغزی ممکن است فوری یا با چند روز تاخیر پس از آسیب‌دیدگی بروز کنند، از جمله:

- ناراحتی‌های تمرکز و حافظه
- زودرنجی و سایر تغییرات شخصیتی
- حساسیت به نور و صدا
- اختلالات خواب
- مشکلات تنظیم روانی و افسردگی
- اختلالات چشمی و بیولوژی

عوارض احتمالی ضربه مغزی عبارتند از:

- صرع. در مورد افرادی که ضربه مغزی داشته‌اند، خطر ابتلا به صرع در پنج سال اول پس از آسیب دو برابر می‌شود.
- اثرات تجمعی ناشی از چندین بار صدمه مغز. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد افرادی که در طول زندگی چندین بار آسیب مغزی را تجربه کرده‌اند ممکن است دچار اختلال پایدار و حتی پیشروندهای شوند که عملکرد عادی بدن را محدود می‌کند.
- نشانگان پساضربه‌ای [۱]. برخی افراد چند روز پس از ضربه مغزی کمک علامت پساضربه‌ای مانند سردرد، سرگیجه و مشکلات تفکر را بروز می‌دهند. این علایم ممکن است برای چند هفته تا چند ماه پس از ضربه مغزی ادامه پیدا کند.
- در حالی به تمرین برگزندن که هنوز با علامت و نشانه‌های ضربه مغزی روبرو هستند.

علامت و نشانه‌های ضربه مغزی علاوه بر فراموشی، شامل موارد زیر می‌شود:



- سردرد یا احساس فشار در سر
- از دست دادن موقت هوشیاری
- سردرگمی و یا احساسی شبیه گرفتاری در مه
- سرگیجه یا "آبالالوگیلاس چیدن"
- وزوز گوش
- تهوع
- استفراغ
- گفتار ناشمرده
- پاسخگویی دیر به سوالات
- چهره خیره
- خستگی

از مهمترین علامت هشداردهنده ضربه به سر می‌توان به حالت **نهوع** و استفراغ، **گیجی**، سردرد، **تاری دید**، از دست دادن تعادل، اختلال در خواب، مشکلات حافظه، **وزوز گوش** و **حسستگی** اشاره کرد.

از مهمترین علل ضربه به سر به ترتیب می‌توان به تصادفات رانندگی، سقوط از ارتفاع، درگیری جسمی، حوادث در حین کار، حوادث داخل منزل و حوادث حین ورزش اشاره کرد

تشنج، صرع، سردردهای مداوم، خونریزی مغزی، عفونت مغزی، فراموشی، عقب ماندگی ذهنی، مرگ مغزی، اختلالات خلقی - روانی و اختلالات هورمونی از جمله پیامدهای ضربه به سر هستند که هر یک از این عوارض می‌توانند تا پایان عمر همراه بیمار باقی بمانند و حتی با مصرف دارو و جراحی به طور کامل برطرف نخواهند شد

ضربه مغزی

ضربه مغزی در واقع به آسیب‌دیدگی یا حرارت مغز در اثر ضربه به سر (تروماتیک) اطلاق می‌شود که چگونگی عملکرد مغز را تغییر می‌دهد. اثرات آن معمولاً موقتی است، اما شامل سردرد و مشکلات تمرکز، حافظه، تعادل و هماهنگی بدن می‌شود علامت و نشانه‌های ضربه مغزی می‌تواند نامحسوس باشد و بلافضله آشکار نشود. علامت شاید چند روز، چند هفته و یا حتی بیشتر طول بکشد. علامت متناول پس از یک آسیب‌دیدگی مغزی تروماتیک عبارتند از سردرد، از دست دادن حافظه (فراموشی) و سردرگمی. فراموشی معمولاً "شامل از دست دادن حافظه درباره رویداد منجر به ضربه مغزی می‌شود.




وں کا سلام شری وند نات بہشتی دربانی پرچم

مرکز آموزشی، پژوهشی و دانی رازی

آسیپ های

مغزی در اثر حوادث



واحد آموزش سلامت

استراحت مناسبت‌ترین راه برای رسیدن به بهبودی مغز پس از رخداد ضربه مغزی است. پژشک توصیه خواهد کرد که از لحاظ جسمی و ذهنی استراحت کنید تا از ضربه مغزی بهبود بیاید.

پیشک شاید توصیه کند روزهای مدرسه و یا روزهای کاری را
کوتاه کنید، در طول روز استراحت داشته باشید، یا حجم تکالیف
مدرسه با شغلی را کاهش دهید تا ضربه مغزی بینوید بیندا کند.

همانطور که نشانه‌های بیماری ببینود می‌باید، به تدریج اجازه دارید فعالیت‌های بیشتری انجام دهید که شامل درگیری فکری می‌شود.

اگر شما یا فرزندتان در طول انجام ورزشی رقابتی دچار ضربه مغزی شدید، از پزشک خود یا پزشک اطفال بپرسید چه زمانی بهتر است به بازی برگردید. از سرگیری زودهنگام تمرین ورزشی باعث افزایش خطر ضربه مغزی دوم و آسیبی بالقوه کشته خواهد شد.

در صورت داشتن هرگونه سؤال یا مشکل در
مراقبت از خود، می توانید با شماره تلفن
در تمام ساعات روز 056 31626213
تماس فرمایید و آموزش‌های لازم را رایگان
دريافت نماييد.

منبع:

www.tebyan.com

- سردردهای پس‌آسیب‌دیدگی [۲]. بعضی افراد از چند هفته تا چند ماه پس از آسیب مغزی دچار سردرد می‌شوند.
 - سرگیجگی پس‌آسیب‌دیدگی [۳]. بعضی افراد تا چند روز، هفته یا ماه پس از یک آسیب مغزی، با نوعی حس دوران یا سرگیجه روبرو می‌شوند.
 - نشانگان برشوره ثانوی [۴]. تجربه ضربه مغزی دوم قبیل از برطوفمیشدن علامت و نشانه‌های ضربه مغزی اول ممکن است به تورم مغزی سریع تبدیل شده و معمولاً منجر به مرگ شود. پس از ضربه مغزی، مقدار مواد شیمیایی مغز تغییر می‌کند. معمولاً حدود یک هفته طول می‌کشد تا مقدار این مواد دوباره به حالت ثابت برگردد. با این حال، زمان بهبودی متغیر است. ورزشکاران هرگز نباید در حالی به تمرين برگردد که هنوز با علامت و نشانه‌های ضربه مغزی روبرو هستند.

شیب در بیمارستان بستری شوید.

اگر پژشک موافق شد، در خانه معاینه خواهید شد، ولی یک نفر باید حداقل ۲۴ ساعت همراه تان بماند و مرتب سر بر زند تا مبادا عالم بیماری بدتر شود. فردی که از شما مراقبت می‌کند بطور مرتب باید بیدار تان کند تا مطمئن شود به طور عادی می‌توانید از خواب بیدار شوید.