

در اتاق عمل چه می گذرد؟


متخصص بیهوشی شما را از نخاع بی حس می کند و در این حالت شما نمی توانید پاهایتان را حرکت بدهید. این وضعیت موقتی است و نباید بترسید. جراح بعد از اطمینان از این که شما متوجه دردی نمی شوید به کمک وسیله ای به نام یورتروسکوپ و از راه مجرای خروجی ادراری وارد مثانه شما می شود و وقتی سنگ را دید به کمک ابزار دیگری آنرا خرد کرده و خارج می کند. اگر امکان خروج کامل سنگ ها وجود نداشته باشد، ممکن است یک لوله باریک در حالب شما بگذارند و آن را با کمک یک سوند ادراری ثابت نگه دارند تا مسیر خروجی ادرار باز بماند. اگر لوله حالب برای شما بگذارند لازم است 24 ساعت در بیمارستان بمانید و طی این مدت آنتی بیوتیک دریافت نمایید و بعد خروج آن با داروی خوراکی مرخص شوید. در بعضی موارد یک لوله داخلی بنام دابل جی برای شما می گذارند که لازم است یک ماه بعد جهت خارج کردن آن مراجعه نمایید و ممکن است طی این مدت شما را جهت سنگ شکنی بفرستند

- برای این روش از بی حسی نخاعی استفاده می شود و طبق صلاحدید پزشک، می توانید صبح روز عمل بصورت ناشتا به بیمارستان مراجعه کنید.
- اگر داروی خاصی مصرف می کنید به دکترتان بگویید زیرا بعضی داروها باعث خون ریزی عمل می شوند.



• سنگ های ادراری گاهی در حالب گیر افتاده و باعث انسداد مسیر خروجی ادرار می شوند. این سنگ ها دردهای تیز و دوره ای را به وجود می آورند.

- در اکثر موارد، سنگ های کوچک حالب با تجویز مسکن خود به خود دفع می شوند ولی اگر سنگ ها بزرگ تر باشند می توان از طریق این روش سنگ شکنی و بدون برشی روی شکم آن را خارج کرد.





پزشکی دانشگاه تهران
مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی رازی

سنگ شکنی حالب از راه مجرا چیست؟



واحد آموزش سلامت



در صورت داشتن هرگونه سؤال یا مشکل در
مراقبت از خود، می توانید با شماره تلفن
31626261 در تمام ساعات روز تماس فرمایید و
آموزشهای لازم را رایگان دریافت نمایید.



درخانه چه کارهایی انجام بدهم؟

- داروهای تجویز شده را در ساعت مشخص و تا انتها مصرف کنید.
- برای شما آنتی بیوتیک و مسکن خوراکی تجویز می شود.
- مایعات فراوان مصرف کنید.
- جهت کمک به دفع خرده سنگ ها فعالیت کنید.
- در یک ظرف مخصوص ادرار کنید تا بتوانید خرده سنگ هارا جمع آوری کرده و جهت آزمایش ببرید.
- ممکن است تا چند روز ادرارتان خونی باشد که طبیعی است اما اگر با مصرف مایعات فراوان بهبود نیافت و طولانی شد با پزشک خود تماس بگیرید و او را در جریان قرار دهید.
- اگر تب یا لرز یا درد شدید پهلو داشتید حتما به پزشک مراجعه کنید.
- پزشک برای کنترل جای لوله برای شما عکس شکم می نویسد.