



فرم شماره 2 - آموزش به بیمار و خانواده

مراقبت های پس از ترخیص

ام . اس

نام خانوادگی:	نام:	بخش: اتاق: تخت:	پزشک معالج:
نام پدر:	تاریخ تولد:	تشخیص (علت بستری):	تاریخ پذیرش:

بیمار محترم ضمن آرزوی سلامتی برای شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید:

مراقبت در منزل :

- از رژیم کم چربی، پرپروتئین، ویتامین و کربوهیدرات مانند قند و نشاسته متعادل استفاده کنید. از رژیم غذایی حاوی روغن زیتون و منابع غنی امگا 3 (تخم مرغ، ماهی و...)، حاوی ویتامین ب (گروه غلات و حبوبات) و ویتامین ث (مرکبات، گوجه فرنگی، آناناس، هندوانه و...) استفاده کنید.
- مقدار مایعات دریافتی را در طول روز تقسیم کنید و از 2 ساعت قبل از خواب مصرف مایعات را محدود کنید.
- غذا را در حجم کم و در دفعات بیشتر استفاده کنید و غذا به طور منظم و به موقع مصرف کنید.
- در طول روز تمرينات کششی آرام و ملایمی را انجام دهید ولی خود را خسته نکنید.
- سعی کنید ورزشی را انتخاب کنید که نشاط آور باشد و از آن لذت ببرید مانند ورزش هایی از جمله یوگا، تای چی، شنا و ورزش های آبی
- برای خروج ترشحات ریوی سرفه و تنفس عمیق و فیزیوتراپی قفسه سینه انجام دهید و از تماس با افراد مبتلا به بیماری عفونی و سرما خورده اجتناب کنید.
- از قرار گرفتن در سرما و گرمای زیاد برای جلوگیری از سفتی عضلات خودداری کنید.
- از تماس با اجسام خیلی سرد و داغ به دلیل اختلال حسی خودداری کنید و تنظیم آب حمام توسط افراد خانواده انجام شود.
- ممکن است نیاز به استفاده از توالتهای مخصوص، میله های مخصوص گرفتن و ریل های محافظ در حمام داشته باشید. می توان این تغییرات را در خانه یا محل کار نیز ایجاد کرد.
- همیشه قبل از ورزش بدنه را گرم کنید و اگر می خواهید دوره های 30 دقیقه ای ورزش داشتید، با 10 دقیقه شروع نموده و به تدریج آن را زیادتر کنید.
- برای ورزش کردن یک فضای آمن را انتخاب کنید. در جاهایی که لغزنده و نور کمی دارند یا کار در آن فضا با خطراتی همراه است ورزش نکنید.
- اگر مشکل تعادل دارید حتی وسیله ای برای گرفتن و تکیه کردن به آن هنگام ورزش در دسترس داشته باشید.
- هر وقت احساس ناراحتی، اذیت شدن یا ناخوشی پیدا کردید ورزش را متوقف کنید.
- در ساعات داغ روز ورزش نکنید (بین 10 صبح تا 2 بعد از ظهر) سعی کنید صحیح یا شب ورزش کنید.
- هنگام ورزش مقدار زیادی مایعات خنک بنوشید. شنا کردن و ورزش های آبی، تمرينات خوبی هستند که بدنه را خنک نگه می دارند.
- همیشه کارت شناسایی که نشان دهنده ابتلاء شما به بیماری ام. اس است همراه داشته باشید.
- کورتیکو استروئیدها همراه با غذا یا شیر استفاده شود.
- تب، لرز، خستگی و درد عضلات (علائم شبه آنفلوآنزا) از عوارض جانبی دارو است و با استراحت برطرف می شود.
- از خوردن آرام بخش ها بدون اجازه پزشک اجتناب کنید.
- داروها طبق دستور پزشک به طور منظم مصرف شود از قطع دارو بدون اجازه پزشک خودداری نمایید.
- در صورت مشاهده موارد زیر به بیمارستان و یا پزشک مراجعه کنید
- در صورت بروز علائم عفونت ادراری (مانند سوزش، ادرار تیره رنگ و خونی، تب و لرز) تنگی نفس و یا بدتر شدن علائم و انتشار بیماری به نقاط جدید بدن به بیمارستان مراجعه کنید
- سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی