



درد قلبی (آنژین صدری)

فرم شماره ۲-آموزش به بیمار و خانواده

مراقبت های پس از ترخیص

شماره پرونده:

| | | | |
|---------------|-------------|-----------------------|--------------|
| نام خانوادگی: | نام: | بخش: اتاق: تخت: | پزشک معالج: |
| نام پدر: | تاریخ تولد: | تشخیص (علت بستره): | تاریخ پذیرش: |

بیمار محترم ضمن آرزوی سلامتی برای شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید:

مراقبت در منزل :

- از پرخوری پرهیز کنید و مصرف کافئین (چای، نوشابه، قهوه) را کم کنید.
 - در صورتی که افزایش وزن دارید، جهت کاهش وزن با کارشناس تغذیه مشورت کنید.
 - از رژیم غذایی کم نمک و پرفیبر (میوه و سبزیجات) استفاده کنید که نه تنها از یبوست (зор زدن) جلوگیری می کند، بلکه تعداد و شدت حملات آنژین را کاهش می دهد. از مصرف انواع دخانیات، الكل خودداری کنید.
 - قبل از کار و غذا ورزش های سبک انجام دهید.
 - ورزش و فعالیت منظم جهت کاهش وزن، تنظیم قند خون، کنترل استرس (فشارهای روانی) و... نقش موثری دارد.
 - از فعالیت در محیط های خیلی گرم یا سرد خودداری کنید. از انجام فعالیت های شدید و خسته کننده و ورزش های سنگین مانند وزنه برداری و ... بدون اجازه پزشک پرهیز کنید.
- در صورت ایجاد درد کلیه فعالیت های خود را متوقف کنید و بنشینید و قرص نیترو گلیسرین را سریعاً زیر زبان قرار دهید و تا قطع کامل درد استراحت کنید.

- امکان دارد سایر داروهای مورد استفاده برای بیماری سرخرگ های قلی، مانند آسپیرین و ... نیز تجویز شوند، که آنها را به موقع مصرف کنید.
- در صورت مشاهده موارد زیر به بیمارستان و یا پزشک مراجعه کنید
- در صورت ایجاد درد، به روش زیر عمل کنید
 - باید تمامی فعالیت های خود را متوقف کنید و بنشینید و قرص نیترو گلیسرین را سریعاً زیر زبان قرار دهید و تا قطع کامل درد استراحت کنید.
 - برای تسريع در شروع اثر در موارد شدید می توان قرص را زیر دندان خرد کرد، از بلع بزاق باید خودداری کنید. در صورت امکان برای جلوگیری از کاهش فشار خون دراز بکشید.
 - در موقع درد می توانید تا ۳ قرص را به فاصله ۱۰-۵ دقیقه زیر زبانی مصرف کنید. اگر درد کاهش نیافت یا شدید شد به اورژانس مراجعه کنید.
 - از زور زدن در موقع اجابت مزاج خودداری کنید.
- بیمارانی که قرص نیترو گلیسرین مصرف می کنند: باید در تمامی اوقات قرص نیترو گلیسرین را همراه داشته باشند. همیشه از قرص تازه استفاده شود زیرا در عرض ۳-۶ ماه اثر خود را از دست می دهد و همیشه در شیشه تیره رنگ با درب بسته نگهداری شود. ظرف قرص را خیلی به بدن نزدیک نگذیند زیرا دمای بدن باعث بی اثر شدن آن می شود.
- برای تسريع در شروع اثر در موارد شدید می توان قرص را زیر دندان خرد کرد. از بلع بزاق باید خودداری کنید. در صورت امکان برای جلوگیری از کاهش فشار خون دراز بکشید.
- در زمان رفتن به مسافت داروهای خود را به اندازه کافی به همراه داشته باشید.

- در صورت مشاهده موارد زیر به بیمارستان و یا پزشک مراجعه کنید
- حمله درد قفسه صدری، علی رغم استراحت و درمان با نیترو گلیسرین، بیش از ۱۵-۲۰ دقیقه طول بکشد.
 - اگر با درد قفسه صدری از خواب بلند می شوید و درد با یک قرص نیترو گلیسرین برطرف نمی شود و همچنین در صورتی که این حملات ادامه یافتد.
 - اگر حمله درد قفسه صدری متفاوت با گذشته یا شدیدتر از حد معمول است
 - سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی