



بیماری دریچه میترال

			شماره پرونده:
نام خانوادگی:	نام:	بخش: اتاق: تخت:	پزشک معالج:
نام پدر:	تاریخ تولد: جنس: <input type="checkbox"/> زن <input type="checkbox"/> مرد	تشخیص (علت بستری):	تاریخ پذیرش:
بیمار محترم ضمن آرزوی سلامتی برای شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام کنید:			
مراقبت در منزل:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- از مصرف انواع دخانیات، الکل و مواد کافئین دار مانند چای و قهوه و... خودداری کنید.</li> <li>- در صورتی که افزایش وزن دارید، جهت کاهش وزن با کارشناس تغذیه مشورت کنید.</li> <li>- از رژیم غذایی پر فیبر نظیر میوه و سبزیجات استفاده نمایید زیرا از یبوست و زور زدن جلوگیری می‌کند.</li> <li>- مصرف نمک را محدود کنید. غذا را بدون نمک طبخ و نمک سر سفره را حذف کنید.</li> <li>- از خوردن غذاهای سنگین و نفاخ و دیر هضم مانند سوسیس و کالباس خودداری نمایید.</li> <li>- بهتر است شروع انجام فعالیت فیزیکی، بازگشت به کار، رانندگی با نظر پزشک معالج انجام شود.</li> <li>- ورزش و فعالیت منظم جهت کاهش وزن، تنظیم قندخون، کنترل استرس یا فشارهای روحی روانی و... نقش مؤثری دارد. میزان انجام فعالیت‌های ورزشی را با نظر پزشک تنظیم کنید. از فعالیت در محیط‌های خیلی گرم یا سرد خودداری کنید.</li> <li>- از انجام فعالیت‌های شدید و خسته‌کننده و ورزش‌های سنگین مانند وزنه برداری و... پرهیز کنید.</li> <li>- از دستورات پزشک خود پیرامون عدم مصرف سیگار قبل و بعد از عمل جراحی پیروی کنید. افراد سیگاری بعد از عمل جراحی با سرعت کم‌تری التیام می‌یابند و احتمال مشکلات تنفسی در حین عمل جراحی برای این افراد بیشتر از سایرین می‌باشد. به همین دلیل، در صورتی که سیگار می‌کشید، باید حداقل دو هفته قبل از عمل جراحی مصرف سیگار را کنار بگذارید. البته بهتر است ۶ تا ۸ هفته قبل از عمل دیگر سیگار نکشید.</li> <li>- از پزشک خود درباره داروهای مورد نیاز برای تسکین دردتان و چگونگی مراقبت از خود در طی دوران بهبودی، سوال کنید. در محل برش قفسه سینه به مدت چند هفته تا چند ماه دردهای شدیدی بخصوص با تغییر وضعیت یا فشار روی این قسمت‌ها و یا در تنفس عمیق حس می‌شود.</li> <li>- زخم‌های ناشی از عمل قلب باز، بسیار به گرما و نور خورشید حساس می‌باشند. بنابراین باید از تماس مستقیم آن‌ها با نور خورشید جدا خودداری کرد. این وضعیت بین شش ماه تا یک سال ادامه دارد.</li> <li>- محل برش جراحی در ناحیه سینه مستعد عفونت هستند. برای پیشگیری از عفونت محل جراحی حداقل امکان خشک و تمیز نگه داشته شود و از خاراندن زخم اجتناب نمایید.</li> <li>- از مالیدن هر گونه پماد و پودر و لوسیون روی ناحیه زخم خودداری شود.</li> <li>- از ایستادن یا نشستن در یک وضعیت برای مدت طولانی پرهیزید.</li> <li>- برای یک تا دو ماه می‌توانید در طول روز و فعالیت، از جوراب الاستیک استفاده نمایید.</li> <li>- در صورتی که محل بخیه‌ها خشک و بدون ترشح باشد استحمام بلامانع است. طول مدت استحمام کوتاه و با همراه باشد.</li> <li>- در حمام روی صندلی بنشینید. از کشیدن لیف و کیسه روی محل زخم پرهیز شود.</li> <li>- از هوای الوده و سنگین اجتناب نمایید. حد الامکان از توالی فرنگی استفاده کنید.</li> <li>- هنگام بلند شدن یا راه افتادن ابتدا چند دقیقه بنشینید و سپس چند دقیقه روی صندلی بنشینید و بعد راه بروید.</li> <li>- یک ماه بعد از عمل جراحی می‌توانید فعالیت جنسی داشته باشید.</li> <li>- از پوشیدن لباس تنگ و با مواد مصنوعی خودداری کنید، زیرا سبب تحریک بخیه‌ها و ایجاد درد و خارش و ورم می‌شود. از لباس‌های نخی و گشاد استفاده نمایید.</li> </ul>			
در صورت بروز علائم زیر پس از جراحی هر چه زودتر جراح خود را مطلع سازید:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تب بالاتر از ۳۸ درجه سانتی‌گراد</li> <li>- احساس درد قفسه سینه مشابه قبل از عمل</li> </ul>			



- لرز شدید و به دنبال آن تب

- تنگی نفس و تپش قلب بدون ارتباط با فعالیت بدنی

- التهاب، قرمزی، گرمی و در نهایت خارج شدن ترشحات چرکی از محل برش‌های جراحی

- در صورت بروز سایر علائم نگران‌کننده و یا اورژانسی



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبز چمن

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی رازی

واحد آموزش سلامت